Сверка плана лечения с клиническими рекомендациями

Восемь строк плана при артериальной гипертензии второй степени сверены с рекомендациями: шесть соответствуют, две расходятся, у каждой строки стоит пункт и класс рекомендации

Что сверялось

План лечения артериальной гипертензии второй степени у пациента с сахарным диабетом второго типа: пять препаратов, три цели, срок контроля. Каждая строка плана сопоставлена с пунктом действующих клинических рекомендаций по артериальной гипертензии у взрослых и с классом рекомендации.

Три состояния строки

«Соответствует» — строка совпадает с пунктом. «Расходится» — строка противоречит пункту; расхождение описывается словами, без оценки. «Отсутствует» — в плане нет того, что рекомендации требуют. Обоснованное отклонение не становится «соответствием»: оно остаётся расхождением с причиной, вписанной врачом.

Строка плана	Пункт и класс	Состояние
Цель давления	целевые значения, класс I	расходится: одно число без оговорки
Периндоприл 5 мг	стартовая терапия, класс I	соответствует
Амлодипин 5 мг	комбинация, класс I	соответствует
Бета-блокатор на старте	при АГ без кардиопоказания	расходится
Статин при высоком риске	гиполипидемическая терапия	соответствует
Метформин 1000 мг дважды	сахароснижающая терапия	соответствует
Контроль через 3 месяца	контроль через 2–4 недели	расходится
Контроль креатинина и калия	безопасность иАПФ	отсутствует

Чего в листе нет

Нет рекомендации «что назначить»: агент не выбирает препарат. Нет оценки переносимости: это осмотр и разговор. Нет автоматической правки плана: правку вносит врач, и только она имеет силу.

Данные кейса сконструированы. Нормы, формулы и структура документа — настоящие.